

어르신 폐렴구균 예방접종 안내문

65세 이상 어르신의 침습성 폐렴구균 감염증* 예방 및 중증 폐렴 예방을 위해
「어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원사업」을 실시하고 있습니다.

* 균혈증을 동반한 폐렴, 뇌 수막염, 심내막염 등

✓ 어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원사업

- **지원대상** 65세 이상 어르신 중 '23가 다당 백신(PPSV23)'을 한 번도 접종하지 않은 어르신
※ 주민등록번호상 출생연도 기준
- **지원내용** 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23), 1회 지원
- **접종기관** 지정 의료기관* 및 보건소

* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 이동통신 앱에서 확인 가능

✓ 예방접종 전·후 주의사항

- 건강 상태가 좋은 날 접종기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문하시기 바랍니다.
- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 기저질환이 있는 어르신께서는 백신 선택(다당 백신 또는 단백결합 백신) 및 접종 시기 등에 대해 의사와 먼저 상담하시기 바랍니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 이상반응 발생 여부를 관찰한 후 귀가합니다.
- 접종 부위는 청결하게 유지해야 합니다.
- 접종 당일은 반나절 이상 충분히 쉬고, 음주나 지나친 운동은 피합니다.

✓ 예방접종 후 이상반응

경미한 증상

- 폐렴구균 예방접종 후에는 접종 부위 통증, 발적, 부종 등과 같은 증상이 나타날 수 있으며, 매년 접종하는 인플루엔자(독감) 예방접종과 비교하여 증상이 심하게 나타날 수 있습니다.
- 이러한 증상은 일반적으로 예방접종 후에 나타날 수 있는 정상 면역반응이며, 대부분 48시간 이내에 저절로 호전되므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.
- 다만, 증상이 장기간 지속될 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

심한 증상

- 예방접종 후 아나필락시스*는 매우 드물지만 생명을 위협할 수 있는 심각한 이상반응이며, 예방접종 후 얼마 지나지 않아 발생할 수 있기 때문에 접종기관에서 20~30분간 머물러 관찰하는 것이 필요합니다.
* 예방접종 후 전신 발진 및 두드러기, 호흡곤란, 실신 등의 증상이 즉시 또는 수십 분 내의 심한 전신적 알레르기 반응
- 그 밖에 평소와 다른 심한 전신증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 방문하도록 합니다.

* 예방접종 후 이상반응이 발생하면 관할 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.

* 정부는 예방접종으로 인한 이상반응 발생 시 예방접종과의 관련성을 심의하여 진료비를 보상하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으며, 자세한 사항은 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.