


# 종자 소독 요령 안내



## 1. 온탕소독



## 2. 약제침지 소독



## 벼 보급종 소독 시 유의사항

- 2022년에 공급되는 벼 정부보급종은 소독이 안 된 종자로 온탕소독 실시 후 약제침지소독을 하면 종자전염 병해충(키다리병, 도열병 등) 예방에 효과적입니다.
  - 단, 온탕소독 시 온도와 시간을 지키지 않으면 발아율 및 소독효과가 떨어질 수 있으므로 주의해야 하며 종자 소독 과정에 따라 약제침지소독을 추가로 실시할 수 있습니다.
  - 정부 보급종과 보급종이 아닌 종자를 함께 침지하면 2차 감염으로 키다리병 등이 확산될 수 있으므로 구분하여 소독하여 주시기 바랍니다.
- 약제침지소독 시 **약제별 희석 배수 및 농약사용 기준을 반드시 준수**하여 주시기 바랍니다.
- 소독 시 종자를 과도하게 겹쳐 쌓으면 소독 효과가 떨어질 수 있으므로 물과 종자 비율을 지켜야 합니다.
- 침종 시 여러품종을 동시에 넣을 경우 품종마다 싹 틔우는 소요시간이 다를 수 있으므로 유념해서 관찰해야 합니다.
- 침종은 **30~32℃에서 1~2일 실시**하며, 싹 틔우기가 늦는 경우 침종 시간을 더 늘려 싹 길이가 **1~2mm 정도**에 파종하는 것이 적당합니다.

